Pacjent z objawami przeziębienia i grypy? Polecaj produkty ASPIRIN®

Skład	Acidum acetylsalicylicum 500 mg + Pseudoephedrini hydrochloridum 30 mg	Acidum acetylsalicylicum 400 mg + Acidum ascorbicum 240 mg	Acidum acetylsalicylicum 800 mg + Acidum ascorbicum 480 mg	Acidum acetylsalicylicum 500 mg	Acidum acetylsalicylicum 500 mg	Acidum acetylsalicylicum 500 mg
Format	Granulat do sporządzania zawiesiny doustnej	Tabletka musująca	Tabletka musująca	Tabletka	Tabletka musująca	Tabletka powlekana
Wskazania	Leczenie objawowe: • obrzęku błony śluzowej nosa i (lub) zatok (zapalenie błony śluzowej nosa, zapalenie zatok) • bólu i gorączki związanych z przeziębieniem i (lub) objawami grypopodobnymi.	Objawowe leczenie dolegliwości bólowych o małym i (lub) umiarkowanym nasileniu np.: • bóle głowy • bóle zębów • bóle mięśniowe Objawowe leczenie dolegliwości bólowych i gorączki w przebiegu przeziębienia i grypy.	Objawowe leczenie dolegliwości bólowych o małym i (lub) umiarkowanym nasileniu np.: • bóle głowy • bóle zębów • bóle mięśniowe Objawowe leczenie dolegliwości bólowych i gorączki w przebiegu przeziębienia i grypy.	• Bóle o małym lub umiarkowanym nasileniu • Gorączka	Bóle o lekkim i średnim nasileniu: • bóle głowy różnego pochodzenia (np. migrenowe) • bóle zębów • bóle mięśni Ból i gorączka w przebiegu przeziębienia i grypy.	Objawowe leczenie: • w gorączce • bólu o małym lub umiarkowanym nasileniu.
Cechy szczególne leku	Zaczyna działać w 15 minut	Szybko przyswajalna, rozpuszczalna formuła z dodatkiem witaminy C	Podwójna ilość składników aktywnych[1]	Ponad 125 lat tradycji i badań klinicznych	Szybko przyswajalna, rozpuszczalna formuła	6x szybsze uwalnianie i 2,5x szybsze wchłanianie dzięki technologii MicroActive®[2,3]
Maksymalne stężenie ASA w osoczu (t_{max})	13-19 minut	15-30 minut	15-30 minut	30 minut	20 minut	17,5 minuty
Dla kogo	Dorośli i młodzież od 16 r.ż.	Młodzież powyżej 12 r.ż. wyłącznie na zlecenie lekarza / Dorośli	Dorośli	Młodzież powyżej 12 r.ż. wyłącznie na zlecenie lekarza / Dorośli	Młodzież powyżej 12 r.ż. wyłącznie na zlecenie lekarza / Dorośli	Młodzież od 12 do 15 r.ż. / Dorośli i młodzież powyżej 16 r.ż. / Osoby starsze powyżej 65 r.ż.
Pojedyncza dawka	1-2 saszetki	1 tabletka musująca / 1-2 tabletki musujące	1 tabletka musująca	1 tabletka / 1-2 tabletki	1 tabletka musująca / 1-2 tabletki musujące	1 tabletka / 1-2 tabletki / 1 tabletka
Maksymalna dzienna dawka	6 saszetek	3 tabletki musujące / 8 tabletek musujących	3 tabletki musujące	3 tabletki / 8 tabletek	3 tabletki musujące / 8 tabletek musujących	6 tabletek / 6 tabletek / 4 tabletki
Dostępne opakowania	10, 20	10, 20, 40	10	10, 100	12	20

[1]W porównaniu do Aspirin C. [2]W stosunku do zwykłych tabletek Aspirin®. [3]M. Voelker, M. Hammer. Dissolution and pharmacokinetics of a novel micronized Aspirin® formulation. Inflammopharmacol. 2012; 20: 225-231.

ASPIRIN_Tabela_Range_05_2026_272x167_druk.indd 1 25.05.2026 06:41

8 powodów, dla których warto polecać pacjentom Aspirin® Antigrip HOT

NOWOŚĆ

- Działa przeciwzapalnie, przeciwgorączkowo i przeciwbólowo
- Zaczyna działać już po 15 minutach
- Działa do 6 godzin[1]
- Zwalcza 8 objawów przeziębienia i grypy, w tym zatkany nos i ból zatok
- Unikalna formuła
- Wygodny format, sprzyjający nawodnieniu organizmu
- Przyjemny, pomarańczowy smak
- Skuteczność ASA+PSE potwierdzona badaniami

Więcej informacji o lekach znajdziesz skanując kod QR

CH-20260519-48

[1]Schachtel et al.; Journal of Clinical Pharmacology, 2010; 50:1429-1437.

ASPIRIN_Tabela_Range_05_2026_272x167_druk.indd 2 25.05.2026 06:41